Centro Cedir — Radiologia di Precisione
Via Cristoforo Colombo, 10 • 83035 Grottaminarda (AV)
Tel: 0825 445522 • WhatsApp: 0825 445522 • info@centrocedir.it

PROTOCOLLO DIAGNOSTICO TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA CARDIACA

PREPARAZIONE CARDIO TC

ESAMI DEL SANGUE E STRUMENTALI OBBLIGATORI (CON MDC)

Presentare i seguenti referti eseguiti di recente (spuntare prima dell'indagine):

- ☐ Creatininemia con eGFR
- ☐ Azotemia
- ☐ Glicemia
- ☐ Quadro proteico elettroforetico
- ☐ Visita cardiologica recente
- ☐ Tracciato ECG

PAZIENTI ALLERGICI (PROTOCOLLO SIAARTI)

Assumere per 3 giorni, prima dell'esame:

- **ZIRTEC compresse:** 1 compressa la sera
- **BENTELAN 1 mg:** 1 compressa al mattino e 1 la sera dopo i pasti
- **NEXIUM 20 mg:** 1 compressa al mattino e 1 la sera

Invio esami preliminari:
Inviare le analisi del sangue e la richiesta medica prima dell'indagine a:
• WhatsApp: **0825 445522** | Email: **esamicontrasto@centrocedir.it**

WHATSAPP CEDIR

Restrizioni alimentari e sostanze eccitanti

- **Un paio di giorni prima dell'esame:** evitare tassativamente **caffè, tè, bevande contenenti caffeina o sostanze eccitanti**.
- Presentarsi all'esame a **digiuno da cibi solidi da almeno 6-8 ore**.

Frequenza cardiaca a riposo (FONDAMENTALE)

- La **frequenza cardiaca a riposo deve essere inferiore a 65 BPM**.
- Il paziente può controllarla autonomamente con l'apparecchio per la pressione o farla verificare al proprio medico curante o cardiologo.
- **Se la frequenza è superiore a 65 BPM:** farsi prescrivere dal cardiologo o dal medico un farmaco per rallentare il battito (preferibilmente **BETABLOCCANTE**).

Terapie abituali e Documentazione

- Mantenere con regolarità tutte le terapie farmacologiche precedentemente prescritte dal medico.
- **Documentazione ed esami precedenti:** Portare in visione tutta la documentazione cardiologica pregressa (visite specialistiche, tracciati ECG, ecocardiogrammi, precedenti TC o coronarografie) per consentire una valutazione comparativa.

Raccomandazione clinica: Una frequenza cardiaca inferiore a 65 BPM è requisito fondamentale per consentire una corretta e nitida ricostruzione tomografica dell'albero coronarico.